



Roma, 8-11 novembre 2018



ITALIAN CHAPTER



GIUSEPPE REIMONDO

TAKE HOME MESSAGES



Roma, 8-11 novembre 2018

Conflitti di interesse



ITALIAN CHAPTER



Ai sensi dell'art. 3.3 sul conflitto di interessi, pag 17 del Regolamento Applicativo Stato-Regioni del 5/11/2009, dichiaro che negli ultimi 2 anni ho avuto rapporti diretti di finanziamento con i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario:

- SHIRE
- NOVARTIS



Roma, 8-11 novembre 2018



ITALIAN CHAPTER



- La performance del test dipende dalla possibilità pre-test di malattia. Necessità di valutazione da parte di centri e personale esperti.
- Prendere in considerazione la diagnosi di adrenoleucodistrofia nei maschi con anticorpi negativi (dosaggio VLCFA).
- Insufficienza surrenalica relativa nella critical illness.



- Ipofisite, adrenalite ... da immune-checkpoint inhibitors:
 - Pitfall diagnostico da concomitante terapia con steroidi sintetici
 - Diagnosi differenziale con iposurrenalismo centrale da ipofisite
 - Escludere metastasi surrenaliche
 - ACTH test con dosaggio aldosterone (adrenalite primitiva)
 - Se dubbio clinico iniziare terapia profilattica



Roma, 8-11 novembre 2018



ITALIAN CHAPTER



- La giusta terapia per ciascun paziente: tra vecchio (non è tutto da buttare) e nuovo (un importante e necessario passo in avanti, ma migliorabile in particolare in termini di flessibilità posologica)
- Il monitoraggio (forse non è vero che non abbiamo la possibilità di misurare):
 - clinica e QOL (maggiore attenzione a questo strumento)
 - emocromo, glicemia, sodio, potassio (renina)?



Roma, 8-11 novembre 2018



ITALIAN CHAPTER



Importanti informazioni mediche



Questo paziente ha bisogno quotidianamente della terapia ormonale sostitutiva con cortisolo.

Nel caso di una grave malattia, vomito o diarrea, deve essere **immediatamente** somministrato idrocortisone 100 mg ev/im e un'infusione salina ev.

Nome

Numero AVS / Data di nascita

European Society of Endocrinology

- Evidenziare nelle relazioni le indicazioni per le crisi
- Fornire il paziente di SOS Card
- Educare i familiari
- Fornire un numero a cui poter fare riferimento in caso di dubbio (in genere il nostro cellulare)
- Non abbiamo indicazioni standardizzate per stress emotivi o fisici intensi (la linea guida è il buon senso ...)