

# Le lesioni cistiche surrenaliche bilaterali: non solo semplici cisti



**Autori:** Uliana Ambra<sup>1</sup>, Paola Sartorato<sup>1</sup>, Ernesto De Menis<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *ULSS2 Marca Trevigiana, Medicina Interna 2, Ospedale Ca' Foncello, Treviso*

Corrispondenza: [ambra.uliana@aulss2.veneto.it](mailto:ambra.uliana@aulss2.veneto.it)



21° Congresso Nazionale AME  
Update in Endocrinologia Clinica  
ROMA 20 - 23 ottobre 2022

**INTRODUZIONE:** Le lesioni surrenaliche possono essere bilaterali in circa il 15% dei casi e necessitano di una attenta diagnosi differenziale potendo includere patologie molto diverse fra loro. Tra queste, le lesioni cistiche surrenaliche, già rare nella forma monolaterale diventano aneddotiche tra le forme bilaterali.

**PRESENTAZIONE DEL CASO:** Paziente femmina di 23 aa, anamnesi muta, per vaghe algie addominali esegue un'ecografia addominale con riscontro incidentale di lesione surrenalica destra. Viene pertanto sottoposta a TC addome dove si evidenziano delle formazioni cistiche bilaterali (dx 3,1x4,3x3,2 cm; sx 1,1 cm max), gli esami ormonali escludono un'iperfunzione e viene posta indicazione a follow-up radiologico. A distanza di circa 10 anni la TC mostra un incremento significativo della lesione con diametro massimo di 7.5 cm che disloca il surrene. La paziente, che inizialmente rifiutava l'intervento, all'età di 33 anni viene sottoposta a surrenectomia dx per via laparoscopica. In sede di intervento la lesione presentava macroscopicamente l'aspetto di una neoformazione cistica multiloculata, l'esame istologico risulta compatibile con linfangioma cistico.



**DISCUSSIONE:** Il linfangioma cistico è una neoplasia benigna di origine endoteliale che origina da un'ectasia dei vasi linfatici; la localizzazione surrenalica è rara (<5%) e ancora meno frequenti lo sono le sue forme bilaterali. All'imaging la diagnosi differenziale può essere difficoltosa in quanto può mimare diverse patologie del surrene. Sebbene non vi sia una presentazione radiologica patognomonica, nei casi descritti, il linfangioma cistico surrenalico, usualmente appare alla TC ipointenso con margini netti e una parete sottile, di bassa intensità (0-20HU). Anche se si presenta come lesione cistica è necessario eseguire uno studio funzionale volto ad escluderne un'eventuale ipersecrezione. La diagnosi è istologica ed immunoistochimica. Per quel che concerne il trattamento, nelle forme sintomatiche viene raccomandata l'escissione chirurgica mentre viene consigliata in quelle di maggiori dimensioni (>4-6 cm) e in aumento.

**TAKE HOME MESSAGES:** Non esistono linee guida specifiche per le lesioni cistiche surrenaliche. Le indicazioni terapeutiche e di follow-up si basano primariamente sulla certezza di diagnosi di benignità e la "sintomaticità". Il linfangioma cistico surrenalico è una patologia rara la cui diagnosi può rivelarsi difficile e sfidante, deve essere posto in diagnosi differenziale tra le lesioni cistiche surrenaliche sia mono che bilaterali.