

DAPAGLIFLOZIN: STOP ALL'IMPIEGO NEL DM1

Nota Informativa di AstraZeneca concordata con le autorità regolatorie europee e AIFA.


A partire dal 25 ottobre 2021 dapagliflozin 5 mg non è più autorizzato per il trattamento di pazienti con diabete mellito di tipo 1 (DM1) e non deve essere più utilizzato in questa popolazione.

L'interruzione di dapagliflozin deve essere eseguita non appena clinicamente possibile, sotto la supervisione di un medico specializzato nel trattamento del diabete.

Dopo l'interruzione del trattamento con dapagliflozin, si raccomanda il monitoraggio frequente della glicemia e l'aumento della dose di insulina con attenzione a ridurre al minimo il rischio di ipoglicemia.

Bibliografia

1. AIFA. Nota informativa importante farmaco concordata con le autorità regolatorie europee e l'Agenzia Italiana del Farmaco. [29/10/2021](#).
2. EMA. Forxiga (dapagliflozin) 5 mg should no longer be used for the treatment of Type 1 Diabetes Mellitus. [29/10/2021](#).



Commissione Farmaci AME

Vincenzo De Geronimo (Coordinatore)(vdg@iol.it)

Giacomo Accardo, Graziella Borzi, Valentina Bullara, Palma Dicorato, Giuseppe Lisco, Pasqualino Malandrino, Ida Fabrizia Pastore, Cinzia Pupilli, Anna Tortora