

TOSSICITÀ DEL KETOCONAZOLO: RACCOMANDAZIONE EMA E AIFA

Responsabile Editoriale
Vincenzo Toscano

Nei giorni scorsi EMA e AIFA hanno pubblicato una raccomandazione alla sospensione dell'impiego di ketoconazolo, farmaco utilizzato come antimicotico, a causa della sua **epatotossicità**. Sono stati riportati casi di epatite, cirrosi, insufficienza epatica a esito fatale o che aveva richiesto trapianto di fegato. La comparsa di epatotossicità si è verificata generalmente tra 1 e 6 mesi dopo l'inizio del trattamento, ma è stata riportata anche prima di un mese dall'inizio del trattamento, alla dose raccomandata di 200 mg. **Non è stata identificata nessuna misura in grado di minimizzare a livelli accettabili il rischio di epatotossicità**, come limitare la durata del trattamento o restringere l'uso a pazienti selezionati.

Nella raccomandazione non viene preso in considerazione l'impiego del farmaco nella sindrome di Cushing. Dal momento che ketoconazolo viene spesso usato dall'Endocrinologo nelle varie condizioni di ipercorticosurrenalismo, è indispensabile essere a conoscenza di questa raccomandazione.

Quando il farmaco viene impiegato nell'ambito della patologia endocrina, il suo uso richiede sempre un attento e stretto monitoraggio clinico e degli esami di funzionalità epatica.

Allegati:

- [testo del comunicato EMA](#)
- [testo del comunicato AIFA](#)